

## 2015 年粤东西北事业单位笔试[医疗类]模拟题

### 一、 判断题：共 20 题。

1. 并不是所有有自觉，有目的的行动都有内心意志努力的成分。
2. 记忆是指过去经验在头脑中的反应。
3. 反射活动分为两类：非条件反射和条件反射。
4. 一级预防亦称临床前期预防。
5. 预防医学是一门应用性学科。
6. 生物医学模式过分强调了人类的自然属性和生物学属性。
7. 无病就是健康。
8. 健康效应谱第二个谱级属于生理效应。
9. 灭菌是指杀死物体上病原微生物的方法。
10. 糖酵解中，磷酸丙糖异构酶催化的反应是限速反应。
11. Rh 阴性受血者接受 Rh 阳性血液后，其血清中就产生了抗 Rh 抗体，虽当时并不发生凝集反应，但再次接受 Rh 阳性血液的输入时，就发生凝集反应。
12. 高胡萝卜素血症的皮肤黏膜黄染，常见于巩膜。
13. 诊断慢性阻塞性肺疾病（COPD）的必要条件是肺功能检查示阻塞性通气功能障碍。
14. 单纯性甲状腺肿一般不伴有功能亢进或功能低下。
15. 甲状腺乳头状腺癌恶性程度高。
16. 肱骨中下 1 / 3 骨折最可能导致桡神经损伤。
17. 男，18 岁，左下肢跛行 15 年。查体发现左侧马蹄内翻足畸形，胫前肌有轻度肌收缩。但不能产生关节运动。其肌力为 1 级。
18. 青春期生长发育最大特点是体格生长加快。
19. 鼻胃管的作用是减轻由于手术、麻醉、术后胃肠运动抑制所引起的胃肠胀气。
20. 已服用碘剂作术前准备的甲亢患者，双侧甲状腺大部切除术应选择紧急手术。

### 二、 单项选择题：共 60 题。

1. C 型性格的人与以下哪一种疾病有关  
A. 冠心病

- B. 脑出血
  - C. 肿瘤
  - D. 湿疹
2. 以下关于应对的说法，错误的是
- A. 应对是一种心理现象
  - B. 应对是一种心理行为策略
  - C. 应对都是有益的
  - D. 应对有时可以消除自己的紧张
3. 根据我国《医疗机构管理条例》对医疗机构概念的规定，下列说法错误的是？
- A、医疗机构都是依法设立的卫生服务机构。
  - B、所有的医学科研和教学机构都可以诊疗活动。
  - C、医疗机构以救死扶伤、防病治病为提高公众的健康水平为宗旨。
  - D、医疗机构可以从事疾病的预防、诊断、治疗、康复、健康教育等活动。
4. 我国居民膳食中，热能的主要食物来源是
- A、动物肝脏
  - B、奶及奶制品 医学考试网
  - C、蔬菜、水果
  - D、粮谷类
5. 某独生子女，偏食严重，只吃一些水果和谷类食物，最近发现手脚麻木，关节疼，并有“抽筋”现象。产生这些症状的主要原因
- A、血清锌下降
  - B、血清钙下降
  - C、血清钾下降
  - D、血清钠下降

6. 目前我国粮食污染最严重的毒素是
- A、黄曲霉毒素
  - B、黄变米毒素
  - C、岛青霉毒素
  - D、杂色曲霉素
7. 生产性粉尘按性质分类, 哪种分法最正确
- A、金属性粉尘、矿物性粉尘、人工无机粉尘
  - B、动物性粉尘、植物性粉尘、人工有机粉尘
  - C、无机粉尘、有机粉尘、混合性粉尘
  - D、合成粉尘、混合性粉尘
8. 预防地方性甲状腺肿流行的最有效措施是
- A、食用碘盐
  - B、除去水中硫氰酸盐
  - C、煮沸饮水
  - D、降低饮用水的硬度
9. 下列叙述不对的是
- A、人类和生物的活动逐渐地并不可逆转地改变着自然环境
  - B、生态系统是人类与周围环境相互作用并进行物质循环与能量交换的结合体
  - C、生态平衡是生态系统各个环节的质和量相对稳定和适应的状态
  - D、生物圈是一个复杂的生态系统
10. 《希波克拉底誓言》的精髓是
- A. 救人, 至少不伤害
  - B. 爱人与爱艺术平行
  - C. 恪守职业道德
  - D. 尊重病人

11. 人命至重，有贵千斤，一方济之，德逾于此。”这段话出自
- A. 《大医精诚》
  - B. 《伤寒杂病论》
  - C. 《内经》
  - D. 《波克拉底誓言》
12. 在临床医学研究中要求对资料保密，以下哪一点是不属于该范畴的
- A、对研究资料严加保密
  - B、对研究成果严加保密
  - C、医师与病人之间的保密
  - D、研究者与受试者之间的保密
13. 对医德审慎理解有误的是
- A、用药如用兵
  - B、用药如用刑
  - C、戒惧恐惧
  - D、避开有风险的病人
14. 尽力吸气后再作最大呼气所能呼出的气量称为
- A. 潮气量
  - B. 最大通气量
  - C. 肺活量
  - D. 时间肺活量
15. 尽力吸气后再作最大呼气所能呼出的气量称为
- A. 潮气量
  - B. 最大通气量
  - C. 肺活量

D. 时间肺活量

16. 阿司匹林影响血小板功能的药理作用机制是

- A. 抑制环氧化酶
- B. 抑制磷脂酶 A2
- C. 抑制脂氧化酶
- D. 抑制过氧化物酶

17. 变异型心绞痛首选下列哪种钙拮抗药

- A. 硝苯地平
- B. 尼群地平
- C. 维拉帕米
- D. 地尔硫卓

18. 下列关于胺碘酮抗心律失常药理作用的描述错误的是

- A. 降低窦房结、浦肯野纤维的自律性和传导性
- B. 明显延长 APD 和 ERP
- C. 作用不依赖于心率的快慢
- D. 有翻转使用依赖性

19. 脉管系统的组成包括

- A. 心血管系统和淋巴系统
- B. 心、动脉、毛细血管和静脉
- C. 心、血管系统和淋巴器官
- D. 心、动脉、静脉和淋巴导管

20. 不属于湿啰音特点的是

- A. 断续
- B. 短暂

- C. 连续多个
- D. 部位易变

21. 心尖第一心音减低见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 心包积液
- D. 肺气肿

22. 风湿性心瓣膜病患者出现发热、贫血、脾肿大，应考虑

- A. 风湿活动
- B. 瓣膜赘生物脱落引起脾栓塞
- C. 合并亚急性心内膜炎
- D. 伴发病病毒性肝炎

23. 高血压伴肌力减弱及血浆二氧化碳结合力升高，可能是

- A. 慢性肾炎
- B. 嗜铬细胞瘤
- C. 原发性醛固酮增多症
- D. 肾动脉狭窄

24. 急性心肌梗塞时慎用洋地黄的原因是

- A. 减慢心率
- B. 降低血压
- C. 加重肺瘀血
- D. 增加心肌耗氧量

25. 颈静脉过度充盈并于深呼吸时更明显，考虑

- A. 心包积液

B. 右心衰竭

C. 上腔静脉血栓形成

D. 肺气肿

26. 与心源性哮喘发生关系不大是:

A. 肺瘀血

B. 睡眠平卧

C. 回心血量减少

D. 并发肺部感染

27. 引起血源性肺脓肿最常见的病原菌是

A. 粪链球菌

B. 葡萄球菌

C. 大肠埃希菌

D. 肺炎克雷白杆菌

28. 下列肺结核类型中, 传染性最强的是

A. 慢性纤维空洞型肺结核

B. 干酪性肺炎

C. 原发性肺结核

D. 急性血行播散型肺结核

29. 女, 65 岁, 间断咳嗽、咳痰 10 年, 加重伴呼吸困难 2 天。血气分析: PH7.35, PaO<sub>2</sub> 56mmHg, PaCO<sub>2</sub> 46mmHg。给予该患者鼻导管、吸氧治疗。如需使用的吸氧浓度为 27%, 则其氧流量应调整为

A. 1.0L/min

B. 1.5L/min

C. 2.0L/min

D. 2.5L/min

30. 关于溃疡病的临场症状，不正确的说法是
- A. 十二指肠溃疡多为空腹和夜间痛
  - B. 胃溃疡多为餐后痛
  - C. 消化性溃疡患者均患有上腹痛
  - D. 十二指肠溃疡易发展为穿透性溃疡
31. 对侧肾良好，患侧肾动脉损伤，可施行
- A 肾切除术
  - B 部分肾切除术
  - C 肾脏修补术
  - D 血管修复术
32. 后尿道断裂诊断主要依靠
- A 骨盆挤压痛
  - B 下腹及骨盆部皮下瘀斑
  - C 会阴部血肿
  - D 尿道造影
33. 肾母细胞瘤的主要临床表现
- A 高血压
  - B 血尿
  - C 腹部包块
  - D 发热
34. 9-原发性慢性肾上腺皮质功能减退症激素替代治疗宜选用
- A. 氢化可的松
  - B. 地塞米松
  - C. 泼尼松(强的松)



- D. 氟氢可的松
35. 男，42岁，2年前诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症。长期口服氢化可的松(30mg/d)替代治疗。近2天发热38℃，咽痛。目前氢化可的松应
- A. 改用等效量的地塞米松
  - B. 因有感染而暂时停用
  - C. 剂量减少1/2
  - D. 剂量增加为2—3倍
36. 女，45岁。肢体软弱无力、夜尿多2年余。今晨起双下肢不能活动。查：血压170/100mmHg，均匀性轻度肥胖，双下肢松弛性瘫痪，血钾2.4mmol/L。最可能的诊断为
- A. 原发性高血压
  - B. 嗜铬细胞瘤
  - C. 肾性高血压
  - D. 原发性醛固酮增多症
37. 女性，26岁，肥胖、头痛伴闭经1年半，查体：BP 180/110mmHg，向心性肥胖。满月脸，皮肤薄。有痤疮，腹壁有宽大紫纹。下肢胫前可凹性浮肿。为明确库欣综合征，拟检查
- A. 血浆皮质醇
  - B. 尿游离皮质醇
  - C. 血皮质醇昼夜节律
  - D. 小剂量地塞米松抑制试验
38. 青年女性，皮肤粘膜出血一周，平时有鼻出血且月经过多。查体红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白80g/L，WBC $10 \times 10^9/L$ ，PLT $10 \times 10^9/L$ ，骨髓增生活跃，巨细胞增加，最可能的诊断是
- A. 再生障碍性贫血
  - B. 血小板减少性紫癜

- C. 过敏性紫癜
- D. 急性白血病

39. 急性粒细胞白血病与急性淋巴细胞白血病的鉴别要点是

- A. 前者多有高热，感染，出血
- B. 前者有白细胞计数增高，多在  $300 \times 10^9/L$  以上
- C. 前者外周血淋巴细胞减少
- D. 前者的幼稚细胞过氧化酶染色阳性

40. 慢性粒细胞白血病急性变，最主要的诊断依据是

- A. 脾显著增大
- B. 进行性贫血
- C. P 染色体阳性
- D. 骨髓中原始+早幼粒细胞  $>0.30$

41. 女，38岁。常从事编织工作，右中指疼痛，屈伸活动受限。右中指掌指关节处可触及硬结，屈伸时有弹响，最可能的诊断是

- A. 骨软骨瘤
- B. 化脓性关节炎
- C. 狭窄性腱鞘炎
- D. 慢性骨髓炎

42. 男，25岁。膝部疼痛2个月，局部略肿，压痛，X线片示胫骨上端呈肥皂泡样阴影，偏心性膨胀性生长，无骨膜反应，首先考虑的诊断是

- A. 骨肉瘤
- B. 骨结核
- C. 转移癌
- D. 骨巨细胞瘤

43. 关于肱骨髁上骨折的叙述错误的是
- A. 多为间接暴力引起
  - B. 屈曲型肱骨髁上骨折易并发血管神经损伤
  - C. 肘后三角正常则说明是伸直型骨折
  - D. 伸直型肱骨髁上骨折容易导致前臂骨筋膜室综合征
44. 关于胫腓骨骨折的描述不正确的是
- A. 胫骨上 1/3 骨折可造成小腿下段的缺血坏死
  - B. 胫腓骨中 1/3 骨折有发生骨筋膜室综合征的可能
  - C. 腓骨中段骨折可引起足下垂
  - D. 胫骨中下 1/3 骨折可发生延迟愈合或不愈合
45. 股骨颈内收型骨折是指 Pauwels 角
- A. 大于  $50^{\circ}$
  - B. 小于  $50^{\circ}$
  - C. 小于  $40^{\circ}$
  - D. 小于  $30^{\circ}$
46. 无眩晕、无听力障碍和肌力完好的患者。出现右上肢指鼻试验不正确和轮替动作差、右下肢跟膝胫试验差。病损部位在
- A. 小脑蚓部
  - B. 右侧小脑半球
  - C. 左侧小脑半球
  - D. 左侧脑桥前庭神经核
47. 宫颈病理切片报告为“鳞状上皮化”，提示为
- A. 癌前病变
  - B. 原位癌
  - C. 浸润癌

D. 糜烂愈合过程

48. 早期浸润性宫颈癌是指宫颈上皮癌变，癌组织

- A. 达基底膜
- B. 已延伸至宫颈腺体
- C. 累及宫体内膜腺体
- D. 穿透基底膜，深度 $<5\text{mm}$

49. 乳腺癌来源于

- A. 小叶间质
- B. 乳腺囊肿
- C. 导管内乳头状瘤
- D. 乳腺导管上皮及腺泡上皮

50. 下面那些情况不适宜进行口对口人工呼吸：

- A. 触电休克
- B. 溺水
- C. 心跳、呼吸骤停着
- D.  $\text{SO}_2$  中毒者

51. 下列有关胸外心脏按压的叙述错误的是：

- A. 平卧硬板床
- B. 在胸骨下段按压
- C. 按压次数每分钟 40-60 次
- D. 按压时双肘伸直

52. 人体四大生命体征指的是：

- A. 体温. 脉搏. 呼吸. 血压
- B. 体温. 呼吸. 心跳. 瞳孔

- C. 心跳. 运动. 呼吸. 血压
- D. 呼吸. 血压. 心跳. 瞳孔

53. 煤矿创伤致残率最高的是:

- A. 四肢伤
- B. 腹腔内脏器破裂
- C. 血气胸
- D. 颅脑伤及多发伤

54. 电击伤伤员的现场救护, 需立即:

- A. 注意保温
- B. 脱离电源
- C. 包扎伤口
- D. 进行心肺复苏

55. 创伤包扎的范围要求超过伤口周围:

- A. 1-2 cm
- B. 3-6 cm
- C. 5-10 cm
- D. 10-15cm

56. 下列哪项不是创伤包扎的目的:

- A. 使伤口与外界环境隔离, 以减少污染机会
- B. 止痛, 缓解伤员紧张情绪
- C. 加压包扎可用以止血
- D. 脱出的内脏纳回伤口再包扎, 以免内脏暴露在外加重损伤

57. 术后止痛的主要途径不包括

- A 镇痛剂止痛

- B 椎管内给药
- C 吸入麻醉
- D 神经阻滞止痛

58. 术后一般监测不包括

- A 呼吸功能监测
- B 肾功能监测
- C 心电监测
- D 血容量监测

59. 下列哪项不是术中导尿管的作用

- A 反映全身微循环灌注情况
- B 预防术后尿潴留
- C 观察有无血尿，了解判断有无输尿管、膀胱损伤
- D 术中观察尿量以监测肾功能

60. 糖尿病病人，其大手术前血糖应控制在（）mmo1/L 左右

- A6
- B9
- C8
- D10

### 三、多项选择题：共 10 题。

1. 胆汁的生理作用是

- A. 乳化脂肪
- B. 中和胃酸
- C. 促进脂肪酸的吸收
- D. 促进维生素 A, D, E, K 的吸收

2. 使得汗液蒸发加快的因素有
  - A. 环境温度高
  - B. 环境温度低
  - C. 空气湿度大
  - D. 空气湿度小
  
3. 职业病危害因素的作用条件有
  - A. 接触机会
  - B. 个体特征
  - C. 接触方式
  - D. 接触时间
  
4. 生物性有害因素的来源有
  - A. 自然疫源
  - B. 生活性污染
  - C. 生产性污染
  - D. 医源性感染
  
5. 道义论（义务论）的主要观点是：
  - A. 病人的生命是神圣的
  - B. 任何时候都把病人的生命放在第一位
  - C. 把对病人负责和社会负责统一起来
  - D. 救死扶伤是医务人员的神圣职责
  
6. 医学伦理学的主要观点是：
  - A. 生命质量论
  - B. 生命神圣论
  - C. 生命伦理论
  - D. 生命价值论

7. 生命神圣论这一观点，它强调：
- A. 每个人的生命是宝贵和神圣的
  - B. 根据病人情况，医务人员可以放弃治疗
  - C. 不论处于何种情况都要积极治疗
  - D. 医务人员要救死扶伤，把病人利益放在第一位
8. 心力衰竭患者于 24 小时内已口服地高辛 1mg 后心率仍快，病情不改善，应该
- A. 继续使用地高辛维持量
  - B. 加用心得安
  - C. 改用异搏定
  - D. 小量速尿伴服钾盐
9. 心房颤动的物诊特点是
- A. 心动过速
  - B. 心律绝对不齐
  - C. 脉率少于心率
  - D. 交替脉
10. 老年男性患者，主诉胸痛，如为心绞痛还要具备
- A. 劳累时发作
  - B. 胸骨后闷痛
  - C. 持续数分钟
  - D. 持续数小时

